

AI TOATE  
MOTIVELE  
SĂ FII MÂNDRU

## Safari® DuoActive

Erbicid

CEA MAI BUNĂ SOLUȚIE PENTRU A MENȚINE CULTURILE  
CURATE ȘI PENTRU A OBTINE PRODUCȚII SIGURE.

# Safari® DuoActive

Erbicid

PRODUS  
NOU

## SAFARI® DUOACTIVE – CEL MAI NOU ERBICID PENTRU SFECLĂ

<b>SUBSTANȚĂ ACTIVĂ</b>	triflusaluron metil 71 g/kg + lenacil 714 g/kg
<b>FORMULARE</b>	granule dispersabile în apă (WG)
<b>CERTIFICAT DE OMOLOGARE ÎN ROMÂNIA</b>	696PC din 22.04.2021
<b>CLASĂ CHIMICĂ</b>	grupa 2; 5
<b>CULTURI</b>	sfeclă de zahăr și sfeclă furajeră
<b>DOZĂ/HA</b>	210 g/ha
<b>TRATAMENTE</b>	Maxim 3 aplicări /sezon
<b>APLICARE</b>	Post-emergent, BBCH 10-BBCH39

## MODUL DE ACȚIUNE AL ERBICIDULUI SAFARI® DUOACTIVE


Triflusaluron metil este un membru al grupului de erbicide sulfonilureice, care sunt inhibitori specifici ai enzimei acetolactat sintază (ALS). Inhibarea enzimei ALS duce la încetarea rapidă a diviziunii celulare și creșterea plantelor.

Lenacil determină inhibarea fotosintezei. Lenacil este absorbit de plante în primul rând de rădăcini, dar poate fi și foliar. Se translocă în plantă prin xilem, are o acțiune sistemică și migrează către site-urile sale de acțiune. Buruienile nu trebuie să fie dezvoltate mai mult de 2 frunze la momentul aplicării.

Cel mai bun control este realizat atunci când solul este umed, bine mărunțit și fără resturi vegetale. Ploaia favorizează transportul substanței active lenacil în plantă.

## RECOMANDĂRI DE UTILIZARE

SAFARI® DUOACTIVE se aplică post-emergent, de la stadiul de cotiledoane (BBCH 10) până la acoperirea a 90% intervalul între rânduri (BBCH 39). Se recomandă aplicarea unui număr maxim de 3 tratamente / sezon / cultură la o doză maximă de 210 g/ha/aplicare de produs formulat.



SAFARI® DUOACTIVE

T1

T2

T3

# Safari® DuoActive

Erbicid

Ațiunea celor 2 substanțe active asigură controlul buruienilor cu frunză lată, inclusiv speciile de buruieni problemă din culturile de sfeclă, precum *Chenopodium*, *Brassica*, *Matricaria* și *Polygonum*.

Pentru un control eficient al buruienilor, se recomandă 3 aplicări consecutive la un interval de 5-7/10 zile sau când apar noi buruieni. Cele mai bune rezultate se obțin atunci când buruienile sunt în curs de răsărire - până la 2 frunze. Pentru buruienile rezistente sau mediu sensibile se recomandă amestecul cu alte erbicide autorizate pentru sfeclă.

Pentru o absorbție și translocare mai rapidă, se recomandă folosirea adjuvantului Trend® 90 în doza de 250 ml/ha.

Volumul de apă recomandat: 200-400 l/ha

## COMBATE EFICIENT BURUIENILE CU FRUNZĂ LATĂ, PENTRU A OBȚINE CULTURI CURATE ȘI PRODUCȚII SIGURE

### BURUIENI SENSIBILE


<i>Amaranthus spp.</i> (Știr)
<i>Brassica napus</i> (Rapiță, samulastră)
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (Traista ciobanului)
<i>Fumaria officinalis</i> (Fumariță)
<i>Galium aparine</i> (Turiță)
<i>Geranium pusillum</i> (Ciocul berzei)
<i>Lamium spp.</i> (Sugel)
<i>Matricaria recutita</i> (Mușețel)
<i>Matricaria maritima</i> (Mușețel sălbatic)
<i>Matricaria inodora</i> (Romaniță)
<i>Papaver rhoeas</i> (Mac roșu)
<i>Polygonum persicaria</i> (Ardeiul-broaștei)
<i>Raphanus raphanistrum</i> (Ridiche sălbatică)
<i>Sinapis arvensis</i> (Muștar sălbatic)
<i>Senecio vulgare</i> (Spălăcioasa)
<i>Thlaspi arvense</i> (Punguliță)
<i>Viola tricolor</i> (Trei frați pătați)
<i>Xanthium strumarium</i> (Cornuți)

### BURUIENI MEDIU SENSIBILE

<i>Aethusa cynapium</i> (Pătrunjelul câinelui)
<i>Abutilon theophrasti</i> (Teișor)
<i>Ambrosia artemisiifolia</i> (Ambrozie)
<i>Atriplex patula</i> (Lobodă)
<i>Chenopodium spp.</i> (Lobodă)
<i>Mercurialis annua</i> (Trepădătoare)
<i>Polygonum aviculare</i> (Troscot)
<i>Polygonum lapathifolium</i> (Iarbă roșie)
<i>Polygonum convolvulus</i> (Hrișcă urcătoare)
<i>Solanum nigrum</i> (Zărnă)
<i>Stellaria media</i> (Rocoină)
<i>Veronica hederifolia</i> (Doritoare)
<i>Veronica persica</i> (Ventrilică)



*Sinapis arvensis*




*Thlaspi arvense*



*Geranium pusillum*



*Matricaria recutita*



*Polygonum persicaria*

## Safari® DuoActive

Erbicid

### AVANTAJE PENTRU FERMIERI

- ✓ erbicid post-emergent pentru sfecla pentru zahăr și sfecla furajeră.
- ✓ spectru larg de combatere, asigură control asupra buruienilor cu frunză lată, inclusiv speciile de *Chenopodium*, *Brassica*, *Matricaria* și *Polygonum*.
- ✓ fereastră largă de aplicare.
- ✓ selectiv pentru toate soiurile de sfeclă de zahăr și furajeră.
- ✓ este compatibil cu erbicidele, fungicidele și insecticidele folosite la cultura de sfeclă de zahăr.
- ✓ 2 moduri diferite de acțiune, pentru prevenirea apariției rezistenței.
- ✓ acțiune de lungă durată.
- ✓ mai ușor de folosit.

FMC AGRO OPERATIONAL ROMANIA SRL

Șos. București-Ploiești nr. 42-44,  
Sector 1, București,  
Băneasa Business & Technology Park,  
Clădirea A, Aripa A2, etaj 1  
Tel.: 004 031 630 6134

[www.fmcagro.ro](http://www.fmcagro.ro)