

# BOUILLIE BORDELAISE WDG (Zeamă Bordeleză)

## Fungicid

Granule dispersabile în apă care conțin 200 g/kg cupru metallic.  
Fungicid foliar cu spectru larg pentru utilizarea pe legumele cu bulbi și tuberculi; cucurbitacee; vinete; struguri; leguminoase; fructe seminoase și sămbruroase; roșii.

**CONȚINE:** 20% cupru metallic din 80% sulfat de cupru neutralizat

**APROBAT ÎN ROMÂNIA CU AUTORIZAȚIA:** 2124/18.12.01

**INFORMAȚII IMPORTANTE:** PENTRU UTILIZAREA DOAR CA FUNGICID

Culturi/situații: legume cu bulbi și tuberculi; cucurbitacee; struguri; leguminoase, fructe seminoase și sămbruroase; roșii.

**CITIȚI ETICHETA ÎNAINTE DE UTILIZARE. UTILIZAREA ACESTUI PRODUS NERESPECTÂND INDICAȚIILE DE PE ETICHETĂ POATE FI CONSIDERATĂ UN DELICT. URMAȚI CODUL DE PRACTICĂ PENTRU UTILIZAREA PRODUSELOR DE PROTECȚIE A PLANTELOR.**

### FRAZE DE PERICOL:

H318 - Provoacă leziuni oculare grave.

H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

### FRAZE DE PRECAUȚIE:

P273 - Evitați dispersarea în mediu.

P280 - Purtați mănuși de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.

P305 + P351 + P338 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face ușor. Continuați să clătiți.

P310 - Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

P391 - Colectați scurgerile de produs.

P501 - Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările naționale în vigoare.

**EUH401** - Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și pentru mediu, în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.

**SP1** - A nu se contamina apa cu produsul sau cu ambalajul său (a nu se curăța echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafață/a se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri)!

**SPe3** - Pentru protecția organismelor acvatice ne-țintă respectați o zonă tampon netratată de 15 m până la apa de suprafață!

**PENTRU A SE EVITA RISURILE PENTRU SĂNĂTATEA UMANĂ ȘI MEDIU, A SE RESPECTA INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE!**

**NUMĂR DE TELEFON ÎN CAZ DE URGENȚĂ:** România 021/3183606 sau 02131836 20 /interior 235, Luni-Vineri, 8:00-15:00; Biroul pentru Regulamentul Sanitar Internațional și Informare Toxicologică, Institutul Național de Sănătate Publică; Strada Dr. Leonte Anastasieviici nr. 1-3; 050463 București.

Lot nr.:

Data fabricației:

**TERMEN DE VALABILITATE:** 2 ani de la data fabricației.

### DISTRIBUITOR PENTRU ROMÂNIA:

UPL AGRICULTURAL SOLUTIONS ROMANIA SRL,,Strada Izvor 92-96, etaj 4, birou A, sector 5, București, Tel.: 021.529.55.44; Fax: 021.529.55.45

### TITULARUL DE ÎNREGISTRARE:

UPL Europe Ltd, The Centre, Birchwood Park, Warrington, WA3 6YN, Regatul Unit

### PRODUCĂTOR:

Cerexagri SAS, Pare Saint Christophe Pole Gallilée 3 - Niveau 1, 10, av. de l'Entreprise - 95863 Cergy Pointoise - France, Tel.: +33 (0) 1 30 17 88 00 - Fax: +33 (0) 1 30 17 88 01

### AMBALATOR:

SC Alchimex SA - Strada Alexandru Constantinescu nr. 63, Sector 1, București



GHS-05



GHS-09



**PROPRIETĂȚI FIZICO-CHIMICE:** BOUILLIE BORDELAISE WDG sub formă de granule autodispersabile și prezintă o masă omogenă fără nici o tendință de aglomerare. Este de culoare albastră.

**INTERVALUL DE REINTRARE:** Produsul este aplicat în general pentru boli foliare, iar intervalul de reintrare este de 21 - 28 de zile de la ultima aplicare.

**MOD DE ACȚIUNE:** Produsul acționează la contactul cu bolile foliare și agenții patogeni având un efect curativ și preventiv.

**UTILIZARE BIO:** Produs aprobat pentru utilizarea în agricultura ecologică cu respectarea prevederilor regulamentului EC 834/2007.

**MODUL DE FOLOSIRE OMOLOGAT (CULTURI, AGENT DE DĂUNARE, DOZE)**

Produsul este utilizat și aprobat pentru combaterea următorilor agenți patogeni:

VIȚE DE VIE:	<i>Plasmopara viticola</i> (mana viței de vie)	0,5% postfloral (5,0 kg/ha în 1000 l apă)
LIVEZI DE PRUNI:	<i>Polystigma rubrum</i> (pătarea roșie a frunzelor) <i>Stigmia carpophila</i> (ciurirea frunzelor) <i>Monilia spp.</i> (putregaiul brun)	0,5% (5 kg/ha) 0,5% (5 kg/ha) 0,5% (5 kg/ha)
LIVEZI DE PIERSICI:	<i>Taphrina deformans</i> (bâscarea frunzelor) <i>Stigmia carpophila</i> (ciurirea frunzelor) <i>Monilia spp.</i> (putregaiul brun)	0,5% (5 kg/ha) 0,5% (5 kg/ha) 0,5% (5 kg/ha)
CIREȘI ȘI VIȘINI:	<i>Blumeriella jaapii</i> (pătarea frunzelor) <i>Stigmia carpophila</i> (ciurirea frunzelor) <i>Monilia spp.</i> (putregaiul brun)	0,5% (5 kg/ha) 0,5% (5 kg/ha) 0,5% (5 kg/ha)
PLANTAȚII DE MERI ȘI PERI:	<i>Venturia inaequalis</i> (rapănul) <i>Venturia pinis</i> (rapăn) <i>Erwinia amylovora</i> (focul bacterian)	0,5% (5 kg/ha) 0,5% (5 kg/ha) 0,75% (7,5 kg/ha)
TOMATE:	<i>Phytophthora infestans</i> (mana târzie) <i>Alternaria solani</i> (mana timpurie) <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (pătarea și bășica frunzelor) <i>Pseudomonas tomat</i> (pătarea pustulară)	0,75% (7,5 kg/ha) 0,75% (7,5 kg/ha) 0,75% (7,5 kg/ha) 0,75% (7,5 kg/ha)
CASTRAVEȚI:	<i>Pseudomonas lacrymans</i> (pătarea unghiulară a frunzelor) <i>Pseudoperonospora cubensis</i> (mana cucurbitaceelor)	0,75% (7,5 kg/ha) 0,75% (7,5 kg/ha)
FASOLE:	<i>Xanthomonas phaseoli</i> (mana comună) <i>Pseudomonas phaseolicola</i> (arsura aureolată)	0,75% (7,5 kg/ha) 0,75% (7,5 kg/ha)
CEAPĂ:	<i>Peronospora destructor</i> (mana cepei)	0,75% (7,5 kg/ha)
PLANTAȚII DE GUTUI:	<i>Erwinia amylovora</i>	0,75% (7,5 kg/ha)

**MĂSURI DE IGIENĂ ȘI DE TENNICĂ A SECURITĂȚII MUNCII:** A se evita inhalarea sau contactul produsului cu ochii și pielea. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecție, nu se bea, nu se mănâncă și nu se fumează. După terminarea lucrului se spală bine mâinile și fața cu multă apă și săpun fierb și se freacă. A nu se lăsa produsul la îndemâna copiilor și a altor persoane neautorizate și în zonele de acces a animalelor. A nu se contamina apa, alimentele, furajele, semințele sau ambalajele acestora. Produsul BOUILLIE BORDELAISE WDG nu trebuie omis din programele de combatere integrată. Produsul BOUILLIE BORDELAISE WDG trebuie aplicat în conformitate cu instrucțiunile și tehnologiile aprobate.

**COMPATIBILITATE:** Produsul BOUILLIE BORDELAISE WDG este compatibil cu majoritatea fungicidelor/insecticidelor utilizate în România. Pentru siguranță, efectuați un test de compatibilitate.

**MĂSURI DE PRIM AJUTOR:** Evitați inhalarea sau contactul cu ochii și pielea. În cazul contactului accidental cu produsul, se iau următoarele măsuri:

**INHALARE:** Transportați victima în aer liber.

**CONTACT CU PIELEA:** Spălați imediat cu apă din abundență și săpun.

**CONTACT CU OCHII:** Spălați imediat cu apă din abundență. Dacă senzația de iritație persistă, consultați un specialist.

**INGERARE:** Dacă nu vă simțiți bine, consultați medicul.

**INSTRUCȚIUNI pentru MEDIC:** Se va trata simptomatic. Nu există niciun antidot specific.  
**CONDIȚII DE DEPOZITARE ȘI TRANSPORT:** Produsul trebuie depozitat în ambalajul original, sigilat, într-o cameră uscată, rezervată exclusiv pentru pesticide, departe de lumina directă a soarelui sau căldură. Transportul trebuie efectuat astfel încât produsul să fie protejat de căldură și intemperii. Ambalajul original trebuie distrus după utilizare, neputând fi folosit în nici un alt scop.

**NOTĂ:** Orice nerecitate a indicațiilor tehnice menționate mai sus duce la o eficacitate redusă sau un eșec total. Pentru clarificări suplimentare, contactați institutul, centrul de cercetare specializat din zonă sau compania de distribuție.

e 1 Kg